

Flujograma para Profilaxis y manejo de NVPO

1. Factores de Riesgo



- Sexo Femenino
- Edad < 50 años
- No Fumador
- Tipo de Cirugía

- Historia de NVPO/Cinetosis
- Opioides perioperatorios
- Tiempo de Cirugía > 60min
- AG con Gases Volátiles

2. Estratificación de Riesgo

Cuantificar el # de factores de riesgos para guiar la terapia

Sin Factor de riesgo

- 1 Antiemético o ninguno

1-2 Factores de riesgo

- 1 estrategia de reducción de riesgo
- 2 Antieméticos

≥3 Factores de riesgo

- 2 estrategias de reducción de riesgo
- 3 Antieméticos

3. Estrategias de Reducción de Riesgo



Minimizar el uso de N₂O, anestésicos volátiles y Neostigmina



Usar Anestesia Regional



TIVA con bajas dosis o libre de opioides



Analgesia Multimodal libre

4. Antieméticos



Antagonistas del receptor 5HT₃
Corticosteroides
Antihistamínicos

Anti-dopaminérgicos
Propofol
Antagonistas del receptor NK1

Anticolinérgicos
Acupuntura
Midazolam

5. Tratamiento de Rescate

- >6h de administrados antagonistas de 5HT₃ o Droperidol, considerar repetir la Dosis y agregar otro fármaco de grupo diferente.
- <6h considerar administrar otro fármaco de un grupo distinto utilizado en la profilaxis.



Los Protocolos de Soporte Clínicos no sustituyen al Juicio Clínico ni a las preferencias y circunstancias del paciente, Contribuyen a su seguridad como a la confiabilidad y confianza del equipo de Salud.